


УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Директора ООО «Точки Роста»

Полупина Е.Д.



«01» Октября 2025 г.



ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДАХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СВЯЗАННЫХ С НИМИ РИСКАХ, ВИДАХ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Диагностические: Диагностические: опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза (истории) заболевания и анамнеза (истории) жизни; осмотр, включая пальпацию, перкуссию, аускультацию, антропометрию (измерение веса, роста, окружности головы, груди, талии), термометрию (измерение температуры тела), тонометрию (измерение артериального давления), Невинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций, неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций, исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы, функциональные методы обследования), в том числе электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, спиртография, пневмотахометрия, пикфлоуметрия, рэзоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиоотография (для беременных), рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, доплерографические исследования, лабораторные методы исследования (в том числе клинические, биохимические, иммунологические, микробиологические (бактериологические, вирусологические), с проведением забора необходимого биоматериала, крови из пальца, крови из вены, мочи, кала, медицинский массаж, лечебная физкультура.

Лечебные и лечебно-диагностические: введение лекарственных препаратов по назначению лечащего врача (в т.ч. ингаляционно, подкожно, внутримышечно, внутривенно, струйно и/или капельно, интраназально, в ухо, в глотку, в горань, интравитально, интраокулярно);

консультации с применением телемедицинских технологий; дистанционное наблюдение за состоянием здоровья, для получения первичной медико-санитарной помощи.

возможные варианты предстоящего медицинского вмешательства, с учетом сопутствующих заболеваний, возрастных изменений моего организма, лечебном режиме после данного медицинского вмешательства и возможном развитии неприятных ощущений и возможном изменении (снижении) качества жизни.

Информирование о том, что:

- все пересаженные волосы выпадают в течении 1 месяца и начинают расти через 3-4 месяца
- после процедуры пересадки возможен эффект «шоклосс» (процесс, когда могут временно поредеть, свои не пересаженные волосы). Этот период может длиться до 3-4 месяцев.
- при начале роста пересаженных волос в реципиентной зоне может появиться раздражение фолликулиты, которые проходят самостоятельно после прорастания основного количества волос (4-6 мес.)

Информирование всех возможных рисков и осложнений, сопутствующих вмешательству, которые могут развиваться вовремя или сразу после медицинского вмешательства, в том числе:

- ☐ плохой рост трансплантированных волос
- ☐ постоянные боли в области скальпа
- ☐ тотальное выпадение донорских волос
- ☐ потеря чувствительности скальпа
- ☐ заметные рубцы на донорских участках
- ☐ неестественный рост трансплантированных волос
- ☐ выпадение трансплантированных волос
- ☐ отек лобной области
- ☐ фолликулит
- ☐ некроз кожи
- ☐ аллергические реакции.